

*Международная научно-практическая конференция  
«Система защиты детей от насилия: достижения и задачи развития»  
18-19 ноября 2010 года, г. Нижний Новгород*

***«Международный опыт организации  
профилактики рискованного поведения  
женщины и насилия над ребенком в  
системе общественного  
здравоохранения»***

***Е.А.Варавикова, к.м.н., в.н.с.,  
ЦНИИ организации и информатизации  
здравоохранения МЗСР РФ, г. Москва***

[dr.e.varavikova@mail.ru](mailto:dr.e.varavikova@mail.ru)

# Цели презентации:

- ❖ Представить обобщенный вектор развития для Нижегородской области по проблеме
- ❖ Осветить подходы ВОЗ, СДС и представить примеры программ
- ❖ Выявить современные тенденции в организации профилактики рискованного поведения женщин и насилия над ребенком в системе ОЗ

**В Нижегородской области**

**644**

**женщины старше 20 лет  
умерли только от причин,  
обусловленных алкоголем  
в 2009 году.**

Примечание: Данные слайдов 3- 5 предоставлены В.Г. Семеновой, ЦНИИОИЗ

# При анализе алкогольной смертности Нижегородской области у женщин, 2009 г.(1):

❖ В возрастной группе 20-39 – превышение общероссийских показателей более чем в 2 раза по:

Алкогольным кардиомиопатиям

Циррозу

Отравлениям и случайным отравлениям

Соматическим заболеваниям

## При анализе алкогольной смертности Нижегородской области у женщин, 2009 г.(2)

- ❖ В возрастной группе 40-59 – в 1.5 раза
- ❖ 60+ - чуть выше или почти как в РФ
- ❖ В группе «Все женщины», Н.обл. создает негативный вклад в алкогольную смертность РФ по соматическим заболеваниям; алкогольным кардиомиопатиям, циррозам и отравлениям.

# Вызовы глобализации и экономического кризиса

- ❖ Глобализация – распространение унифицированной «культуры» потребления
- ❖ Глобальный кризис = социальные потрясения и безработица
- ❖ Общемировая тенденция пересмотра социальных обязательств государств перед гражданами
- ❖ Одинокие женщины, и особенно с детьми – наиболее уязвимая группа населения в РФ

Профилактика плохого обращения с детьми проводится ООН и ВОЗ – в рамках программ по борьбе с насилием. (*Study on Violence Against Children*)

- ❖ 1. Более 53000 детей убивают в мире каждый год
- ❖ 2. Распространенность сексуального насилия среди детей до 18 лет, составляет около 73 миллионов (7%) среди мальчиков и 150 миллионов (14% ) среди девочек
- ❖ 3. Насилие, примененное против младенцев и детей раннего возраста является ведущим и пожизненным фактором риска развития психиатрических расстройств и самоубийств, включающим депрессию, агрессию и насилие по отношению к окружающим, курение, алкоголь и наркотики

# Документы ВОЗ

- ❖ Всемирный Доклад о насилии и здоровье (Главы 2 и 3)
- ❖ Глобальная кампания по профилактике насилия
- ❖ Резолюция ВОЗ 56.24




# Создание руководства по профилактике насилия над детьми и пренебрежения ими ВОЗ – ISPCAN

- ❖ Сотрудничество ВОЗ и International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN)
- ❖ Руководство для разработки действий и накопления доказательств, с целью создания программ профилактики на национальном уровне, для родителей и воспитателей
- ❖ Показано, как измерять плохое обращение и его последствия
- ❖ Поможет странам действовать в рамках резолюций ООН

## *Полезные ссылки*

- ❖ - Preventing child maltreatment: a guide to taking action and generating evidence [pdf 868kB]
- World report on violence and health, Chapter 3, Child abuse and neglect by parents and other caregivers [pdf 180kb]
- UN Secretary-General's Study on Violence against Children
- Preventing violence: a guide to implementing the recommendations of the World report on violence and health
- Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence

# Всемирная организация здравоохранения, 2005



- ❖ **WHO Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women**
- ❖ **[http://www.who.int/gender/violence/who\\_multicountry\\_study/summary\\_report/en/index.html](http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/summary_report/en/index.html)**

# Статистика ВОЗ

- ❖ В разных странах мира от 10 до 69 % женщин испытывают физическое насилие со стороны мужчины-партнера
- ❖ 50-70% женщин, погибающих насильственной смертью, убивают их мужья или партнеры.
- ❖ За свою жизнь одна из четырех женщин становится жертвой сексуального насилия со стороны своего партнера.

# Рекомендации ВОЗ, 2005

- ❖ Укрепление политической приверженности и действий
- ❖ Укрепление первичной профилактики
- ❖ Вовлечение сектора образования
- ❖ **Укрепление ответных мер сектора здравоохранения**
- ❖ Поддержка женщин, живущих в атмосфере насилия
- ❖ Повышение системы уголовного правосудия
- ❖ Поддержка исследований и сотрудничества

# Women and health: today's evidence tomorrow's agenda .

## Женщины и здоровье: сегодняшние доказательства – завтрашняя программа действий

World Health Organization  
November 2009  
ISBN: 9789241563857



# Обязательства системы здравоохранения (1)

- ❖ Система здравоохранения должна занять принципиальную и непримиримую позицию а также выступить по этому вопросу
- ❖ Специалисты здравоохранения должны распознавать ситуации риска, регистрировать выявленные случаи и сообщать о них.
- ❖ Некоторые страны создали протоколы регламенты для таких действий и внедрили их среди медиков (врачей и медсестер) на уровне первичной медицинской помощи.

# Обязательства системы здравоохранения (2)

- ❖ Эти протоколы следует также распространить в педиатрии; в них должен войти анализ факторов риска для раннего выявления физического или психологического насилия в отношении девочек и подростков в семьях и школах.
- ❖ Система здравоохранения должна гарантировать адекватное лечение физических и психологических последствий насилия в отношении женщин.



# Обязательства системы здравоохранения (3)

- ❖ Пути выполнения обязательств:
- ❖ Профессиональные стандарты
- ❖ Оплата деятельности медицинского работника по профилактике в системе страхования
- ❖ Работа с этикой и профессиональными навыками медицинских работников
- ❖ Межсекторальное сотрудничество

# Сектор здравоохранения должен найти пути обеспечения того, что бы:

- ❖ женщины, которые испытали насилие и/или страдают от зависимостей не испытывали стигматизации или обвинений, когда они стремятся получить помощь от учреждений здравоохранения,
- ❖ женщины получали надлежащую медицинскую помощь и другие виды помощи, а также
- ❖ была обеспечена их конфиденциальность и безопасность при их обращении.

# Использование служб охраны репродуктивного здоровья

- ❖ Доступность и широкое использование служб охраны репродуктивного здоровья (в том числе дородовой помощи, услуг по планированию семьи, после аборта и услуг, связанных с заболеваниями, передающимися половым путем) позволяет в большинстве стран предоставить услуги для выявления женщин, подвергающихся насилию в отношениях и предлагая им направление или поддержку.

# Национальный бюджет по контролю наркотиков США в 2011 г.:

- ❖ \$15.5 миллиардов долларов для снижения употребления наркотиков и их последствий в США
- ❖ Эти ресурсы распределяются вокруг основных функций:
  - Профилактика употребления
  - Лечение
  - Соблюдение законодательства
  - Международное сотрудничество.
- ❖ Будет создана национальная система мониторинга и профилактики у подростков
- ❖ Программа профилактики у студентов

- ❖ Violence against women is the most common source of injury to women. Violence against women affects 1 to 4 million women in the United States each year (Asher, Crespo & Sugg, 2001).

# Проблемы и решения в сельских поселениях, примеры Австралии и США

- ❖ Программы скрининга женщин и детей
- ❖ Мониторинговые системы, критерии диагностики
- ❖ Вовлечение педиатров, гинекологов, педагогов, полицейских
- ❖ Специальное обучение
- ❖ Работа с населением

# Сексуальное насилие

- ❖ Люди, которые пережили сексуальное насилие в детском и подростковом возрасте, гораздо чаще страдают от психических проблем (депрессии и др.) и более склонны к рискованному поведению с точки зрения ВИЧ, алкоголя и наркотических веществ.

# *Виды насилия*

- ❖ Физическое
- ❖ Сексуальное
- ❖ Психологическое





# *Для большинства форм насилия характерны общие признаки*

*Например:*

- ❖ акты насилия обычно совершают **знакомые женщине мужчины**;
- ❖ насилие часто является **скрытым**;
- ❖ жертвами чаще становятся **молодые**, а не пожилые женщины;
- ❖ в сексуальном насилии часто встречаются **не физические формы принуждения**;
- ❖ и **социальные причины** приводят к ситуациям уязвимости у женщин, доминирующим формам поведения у мужчин и к стигматизации жертв

# *Связь рано пережитого насилия*


в Ванкувере когортное исследование потребителей инъекционных наркотиков установило, что 33% женщин и 13% мужчин в детском возрасте подверглись сексуальному насилию; Всего же 68% женщин и 13% мужчин сообщили об имевших место случаях сексуального насилия в своей жизни.

# Последствия насилия

- ❖ Многие женщины переживали физическое, эмоциональное и сексуальное насилие в детском и подростковом возрасте.
- ❖ Женщины могут начать употреблять алкоголь и наркотики, чтобы справиться с негативным опытом насилия.
- ❖ Сложности в общении с сексуальным партнером, сложнее настоять на использовании презервативов, что увеличивает вероятность сексуального риска.

# вопросы психического здоровья

- ❖ Проведение групп поддержки женщин, переживших сексуальное насилие.
- ❖ Открытые медицинские службы и дроп-ин центры, где люди могут встречаться друг с другом помогают преодолеть одиночество и депрессию.
- ❖ Аут-рич программы, предоставляющие как обмен шприцев, так и одежду и еду, они могут достичь изолированные группы, среди которых велик риск психических проблем и ВИЧ.

- 
- ❖ Мы можем и должны лучше разобраться в причинах и особенностях этого явления.
  - ❖ Распознавать факторы риска и обнаруживать проявление насилия на ранней стадии.
  - ❖ Перестать считать насилие в отношении женщин проблемой, затрагивающей исключительно женщин.
  - ❖ По сути это важнейший вопрос социальной сферы и здравоохранения, учитывая его масштабность и серьезные последствия для коллективной безопасности и здоровья семей и общества.

# Рекомендации работникам служб профилактики

- ❖ Осознание тесной связи между психическим здоровьем, социальными факторами и способностью человека заботиться о своем здоровье.
- ❖ Сотрудники профилактических программ должны учиться определять такие проблемы, как депрессию у своих клиентов.
- ❖ Службы профилактики должны быть готовы направить своего клиента в службы, где им могут оказать помощь

# *Программа "New Haven", в США*

- ❖ предназначена для женщин, употребляющих алкоголь и наркотики, и женщин с высоким риском передачи ВИЧ.
- ❖ Социальные работники службы путешествуют на передвижных медпунктах, предоставляя интенсивное индивидуальное консультирование.
- ❖ Консультирование проводится также с друзьями и членами семьи клиента. Социальные работники оказывают психологическую поддержку людям в состоянии кризиса, предоставляют транспорт, юридическую помощь, одежду и еду, а также консультируют родных и близких клиентов.

# *Ссылки*

- ❖ [http://www.health.vic.gov.au/vdapc/downloads/drug\\_prev\\_guide.pdf](http://www.health.vic.gov.au/vdapc/downloads/drug_prev_guide.pdf)
- ❖ <http://www.whitehousedrugpolicy.gov/publications/policy/11budget/fy11highlight.pdf>



*Спасибо за внимание,  
желаю Вам успешного  
выполнения задуманного!*

